



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
Via Salerno 1 - 20142 Milano
Tel. 02 89159535 Tel. e Fax 02 810820
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
posta certificata: ic.ilaria.alpi@pec.it

Circolare Generale n. 28

Milano, 15.10.2012

**AGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
AL PERSONALE ATA**

SEDE di Via Salerno 1
SEDE di Via Salerno 3
SEDE di Via San Colombano
SEDE di Via Balsamo Crivelli

Oggetto: D.Lgs. 81/08. Autoprotezione durante gli interventi in caso di malore o infortunio.

Agli Addetti al Primo Soccorso e al Personale ATA, che sono tra i soggetti maggiormente coinvolti negli interventi di soccorso in caso di malore o infortunio di alunni e personale della scuola (vedi Circ n. 14/2012 "Infortuni a scuola. Che cosa fare?"), si raccomanda di avere sempre con sé guanti monouso, per autoprotettersi in caso di contatto con fluidi biologici.

I guanti in lattice sono disponibili in sala medica della Sede principale.

Chi dovesse soffrire di allergia al lattice è pregato di segnalarlo alla Segreteria e richiedere la fornitura di guanti in polimeri sintetici.

L'allergia al lattice è una manifestazione clinica in crescente aumento scatenata dalle numerose proteine contenute nel lattice dotate di elevata attività antigenica.

Si tratta di reazioni che coinvolgono la cute, l'apparato respiratorio e cardiovascolare, in alcuni casi di estrema gravità, con casi anche mortali. (Fonte: *Guido Marcer - Servizio di Allergologia - Istituto di Medicina del Lavoro - Università di Padova*)

Indicazioni pratiche su come riconoscere se si è allergici al lattice.

LINEE GUIDA Regione Lombardia D. n. 22303 del 24-09-2001

Hai avuto:

- Gonfiore o prurito alle labbra in occasione di una visita medica o odontoiatrica (il medico adoperava guanti di gomma) o gonfiando palloncini?
- Gonfiore o prurito alle mani se impieghi guanti di gomma?
- Gonfiore o prurito in loco all'impiego di profilattici o diaframmi o dopo una visita rettale o vaginale?
- Rinorrea e/o starnuti e/o tosse stizzosa, prurito, naso chiuso, lacrimazione, bruciore agli occhi, arrossamento della pelle, crisi d'asma, mancanza di fiato, collasso in concomitanza o in luogo dei sintomi sopra riportati?
- Reazioni anomale durante anestesia?

RSPP
Arch. Anna Cattaneo

DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Micaela Francisetti

